

多项式优化入门

王杰

中国科学院数学与系统科学研究院

中国科学院大学, 2025 年春季



课程内容

- 1. 半定规划
- 2. 平方和理论
- 3. 测度和矩
- 4. 矩-平方和松弛分层
- 5. 项稀疏 (TS)
- 6. 变量稀疏 (CS)
- 7. 扩展与应用
- 8. 软件与实验

线性规划 (LP)

原问题：

$$\begin{aligned} p_{\text{lp}} := \inf_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n} \quad & \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \\ & \mathbf{x} \geq 0 \end{aligned}$$

对偶问题：

$$\begin{aligned} d_{\text{lp}} := \sup_{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m} \quad & \mathbf{b}^\top \mathbf{y} \\ \text{s.t.} \quad & A^\top \mathbf{y} \leq \mathbf{c} \end{aligned}$$

线性规划的基本性质

- 弱对偶性: $p_{\text{lp}} \geq d_{\text{lp}}$
- 强对偶性: $p_{\text{lp}} = d_{\text{lp}}$
- 互补松弛: $\mathbf{x}^* \circ (\mathbf{c} - A^\top \mathbf{y}^*) = \mathbf{0}$

基本定义

- \mathbb{S}_n : n 阶对称矩阵
- \mathbb{S}_n^+ : n 阶半正定矩阵
- $A \in \mathbb{S}_n^+ \iff A \succeq 0$
- $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB)$ for $A, B \in \mathbb{S}_n$

半定规划 (SDP)

原问题：

$$p_{\text{sdp}} := \inf \quad \langle C, X \rangle$$

$$\text{s.t.} \quad \langle A_i, X \rangle = b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

$$X \succeq 0$$

对偶问题：

$$d_{\text{sdp}} := \sup \quad \mathbf{b}^\top \mathbf{y}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^m A_i y_i \preceq C$$

- 线性规划的非线性推广
- 最优电力流、组合优化、计算机视觉、量子信息、信号处理…

半定规划的弱对偶性

- 弱对偶性: $p_{\text{sdp}} \geq d_{\text{sdp}}$

设 X 和 y 分别是原问题和对偶问题的可行解:

$$\langle C, X \rangle - \mathbf{b}^T y = \langle C, X \rangle - \sum_{i=1}^m \langle A_i, X \rangle y_i = \left\langle C - \sum_{i=1}^m A_i y_i, X \right\rangle \geq 0$$

半定规划的最优化条件

- X 和 y 分别是原问题和对偶问题的可行解
- 最优化条件：

$$(C - \sum_{i=1}^m A_i y_i) X = 0 \iff \langle C - \sum_{i=1}^m A_i y_i, X \rangle = 0 \iff \langle C, X \rangle = b^\top y$$

⇒ X 和 y 分别是原问题和对偶问题的最优解

半定规划的强对偶性

- 若原问题或对偶问题**严格可行**，则强对偶性成立： $p_{\text{sdp}} = d_{\text{sdp}}$
- 若原问题和对偶问题**都是可行的**，则原问题和对偶问题均有最优解

多块半定规划

原问题：

$$\begin{aligned} p_{\text{sdp}} &:= \inf && \sum_{k=1}^t \langle C_k, X_k \rangle \\ \text{s.t.} & && \sum_{k=1}^t \langle A_i^k, X_k \rangle = b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ & && X_k \succeq 0, \quad k = 1, \dots, t \end{aligned}$$

对偶问题：

$$\begin{aligned} d_{\text{sdp}} &:= \sup && \mathbf{b}^\top \mathbf{y} \\ \text{s.t.} & && \sum_{i=1}^m A_i^k y_i \preceq C_k, \quad k = 1, \dots, t \end{aligned}$$

应用：二元二次规划 (BQP)

$$\begin{cases} \inf_{\mathbf{x}} & \mathbf{x}^\top Q \mathbf{x} \\ \text{s.t.} & x_i^2 = 1, \quad i = 1, \dots, n \end{cases} \quad \iff \quad \begin{cases} \inf_X & \langle Q, X \rangle \\ \text{s.t.} & X = \mathbf{x} \mathbf{x}^\top \succeq 0 \\ & X_{ii} = 1, \quad i = 1, \dots, n \end{cases}$$

$$\begin{cases} \inf_X & \langle Q, X \rangle \\ \text{s.t.} & X \succeq 0, \quad \text{rank}(X) = 1 \\ & X_{ii} = 1, \quad i = 1, \dots, n \end{cases} \quad \xrightarrow{\text{relax}} \quad \begin{cases} \inf_X & \langle Q, X \rangle \\ \text{s.t.} & X \succeq 0 \\ & X_{ii} = 1, \quad i = 1, \dots, n \end{cases}$$

Goemans-Williamson rounding

- **Step 1:** 将 X 分解成 $X = V^T V$, 其中 $V = [v_1, \dots, v_n] \in \mathbb{R}^{r \times n}$,
 $r = \text{rank}(X)$. 由于 $v_i^T v_i = X_{ii} = 1$, 我们得到 r 维单位球面上的 n 个点
 v_1, \dots, v_n .
- **Step 2:** 随机选取 \mathbb{R}^r 中的一个超平面（经过原点）, 根据 v_i 位于超平面的哪一侧给 x_i 赋值 +1 或 -1.

最大割问题的近似比

- 对角占优矩阵: Q 是对称矩阵且对于所有的 i , $Q_{ii} \geq \sum_{j \neq i} |Q_{ij}|$
- 最大割问题: $\max_{x_i = \pm 1} \frac{1}{4} \sum_{(i,j) \in E} (x_i - x_j)^2$

定理

假设 X^* 是 SDP 松弛问题的最优解, x^{sdp} 是 Goemans-Williamson rounding 给出的近似解. 那么,

$$\alpha_{GW} \cdot \langle Q, X^* \rangle \leq \mathbf{E} \left((x^{\text{sdp}})^\top Q x^{\text{sdp}} \right) \leq \langle Q, X^* \rangle,$$

其中, $\alpha_{GW} \approx 0.878$.

应用：低秩矩阵补全

- 低秩矩阵补全问题：给定低秩矩阵 $M \in \mathbb{R}^{s \times t}$ 的一组矩阵元 $\{M_{ij}\}_{(i,j) \in \Omega}$ ，恢复出低秩矩阵 M
- 可建模为凸优化问题：

$$\begin{cases} \inf_{Z \in \mathbb{R}^{s \times t}} \|Z\|_* \\ \text{s.t. } Z_{ij} = M_{ij}, \quad \forall (i,j) \in \Omega \end{cases}$$

其中， $\|Z\|_* := \text{Tr}(Z^\top Z)^{\frac{1}{2}}$ 是 Z 的核范数

应用：低秩矩阵补全

$$\left\{ \begin{array}{ll} \inf_{Z \in \mathbb{R}^{s \times t}} & \|Z\|_* \\ \text{s.t.} & Z_{ij} = M_{ij}, \forall (i, j) \in \Omega \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{l} \inf_{X \in \mathbb{S}_{s+t}} \text{Tr}(X) \\ \text{s.t.} \quad \left\langle \begin{bmatrix} 0_{s \times s} & E_{ij}^\top \\ E_{ij} & 0_{t \times t} \end{bmatrix}, X \right\rangle = 2M_{ij}, \forall (i, j) \in \Omega \\ \quad \quad \quad X = \begin{bmatrix} U & Z^\top \\ Z & V \end{bmatrix} \succeq 0 \end{array} \right.$$

定理 (Candes, Recht, and Tao, 2010)


假设矩阵 M 低秩且 *incoherent*, 样本个数满足 $|\Omega| \geq Cn(\log n)^2$,
 $n = s + t$, C 是常数. 则 M 可通过求解半定规划问题被准确恢复.

图的基本定义

- 图 $G(V, E)$: 顶点集 V , 边集 $E \subseteq \{\{v_i, v_j\} \mid v_i \neq v_j, (v_i, v_j) \in V \times V\}$
- 团 (clique): 完全子图
- 极大团 (maximal clique): 不包含于更大的团
- 最大团: 包含顶点个数最多的团
- 团数: 最大团包含顶点的个数

弦图 (chordal graph)

- 弦：连接圈中非邻接顶点的边
- 弦图：长度大于等于 4 的圈必有一条弦



RIP 条件

子集 $I_1, \dots, I_p \subseteq [n]$ 满足 RIP (running intersection property): 对每个 $k \in [p - 1]$, 存在 $i \leq k$ 使得

$$\left(I_{k+1} \cap \bigcup_{j \leq k} I_j \right) \subseteq I_i$$


定理

一个连通图是弦图当且仅当它的极大团集满足 RIP.

弦扩张


- 弦扩张：任何非弦图通过添加合适的边可以变成弦图
 - ▶ 最大弦扩张：将连通分支变成完全图
 - ▶ (近似) 最小弦扩张：团数尽可能小

图：弦扩张



稀疏矩阵

- $\mathbb{S}(G, 0)$: $Q \in \mathbb{S}_n$, $Q_{ij} = Q_{ji} = 0, \forall i \neq j$ 且 $\{i, j\} \notin E$
- $\mathbb{S}^+(G, 0) := \mathbb{S}(G, 0) \cap \mathbb{S}_n^+$
- $\mathbb{S}(G, 0)$ 中的矩阵具有块稀疏结构: 每个块对应 G 的一个极大团



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

稀疏矩阵

- 对 $G(V, E)$ 的任一极大团 C , 定义矩阵 $R_C \in \mathbb{R}^{|C| \times |V|}$:

$$[R_C]_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{如果 } C(i) = j \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- $Q_C = R_C Q R_C^\top \in \mathbb{S}_{|C|}$: 提取 Q 的子矩阵 Q_C
- $Q = R_C^\top Q_C R_C$: 将 Q_C 扩充成稀疏矩阵 Q

稀疏半正定矩阵分解

定理

设 G 是弦图, C_1, \dots, C_p 是 G 的极大团集. 则 $Q \in \mathbb{S}^+(G, 0)$ 当且仅当存在 $Q_k \in \mathbb{S}_{|C_k|}^+$, $k \in [p]$ 使得 $Q = \sum_{k=1}^p R_{C_k}^\top Q_k R_{C_k}$.

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \succeq 0 \iff Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} (\succeq 0) + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} (\succeq 0)$$

半正定补全矩阵

- 对图 G 定义投影 $\Pi_G : \mathbb{S}_n \rightarrow \mathbb{S}(G, 0)$:

$$[\Pi_G(Q)]_{ij} = \begin{cases} Q_{ij}, & \text{如果 } i=j \text{ 或 } \{i,j\} \in E \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 半正定补全矩阵:

$$\mathbb{S}^+(G, ?) := \Pi_G(\mathbb{S}_n^+) = \{\Pi_G(Q) \mid Q \in \mathbb{S}_n^+\}$$

半正定补全矩阵刻画

定理

设 G 是弦图, C_1, \dots, C_p 是 G 的极大团集. 则 $Q \in \mathbb{S}^+(G, ?)$ 当且仅当 $Q_{C_i} \succeq 0, i = 1, \dots, p.$

$$\begin{bmatrix} \bullet & \bullet & \bullet & ? \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ ? & \bullet & \bullet & \bullet \end{bmatrix} \succeq 0 \iff \begin{bmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{bmatrix} \succeq 0, \begin{bmatrix} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{bmatrix} \succeq 0$$

SDP 的主要算法

►通用算法

- 内点法：高精度解，内存占用大
- ALM+ 半光滑牛顿法：中/高精度解，内存占用较小
- ADMM：低精度解，内存占用较小

►利用常数迹性质

- CGAL：低精度解，内存占用小

►利用低秩性质 ($m \leq n$)

- Burer-Monteiro 分解 (local search/流形优化)：高精度解，内存占用小

►利用秩一性质 ($m \gg n$)

- Local search + L-BFGS：高精度解，内存占用小

SDP 的主要算法

►通用算法

- 内点法：高精度解，内存占用大
- ALM+ 半光滑牛顿法：中/高精度解，内存占用较小
- ADMM：低精度解，内存占用较小

►利用常数迹性质

- CGAL：低精度解，内存占用小

►利用低秩性质 ($m \leq n$)

- Burer-Monteiro 分解 (local search/流形优化)：高精度解，内存占用小

►利用秩一性质 ($m \gg n$)

- Local search + L-BFGS：高精度解，内存占用小

SDP 的主要算法

►通用算法

- 内点法：高精度解，内存占用大
- ALM+ 半光滑牛顿法：中/高精度解，内存占用较小
- ADMM：低精度解，内存占用较小

►利用常数迹性质

- CGAL：低精度解，内存占用小

►利用低秩性质 ($m \leq n$)

- Burer-Monteiro 分解 (local search/流形优化)：高精度解，内存占用小

►利用秩一性质 ($m \gg n$)

- Local search + L-BFGS：高精度解，内存占用小

SDP 的主要算法

►通用算法

- 内点法：高精度解，内存占用大
- ALM+ 半光滑牛顿法：中/高精度解，内存占用较小
- ADMM：低精度解，内存占用较小

►利用常数迹性质

- CGAL：低精度解，内存占用小

►利用低秩性质 ($m \leq n$)

- Burer-Monteiro 分解 (local search/流形优化)：高精度解，内存占用小

►利用秩一性质 ($m \gg n$)

- Local search + L-BFGS：高精度解，内存占用小

SDP 软件

- 商业软件: MOSEK, COPT
- 开源软件
 - ▶ 内点法: SDPT3, SEDUMI, SDPA
 - ▶ 半光滑牛顿 ALM: SDPNAL+
 - ▶ ADMM: COSMO, CDCS
 - ▶ 低秩 ALM: SDPLR, ManiSDP
 - ▶ 秩一 L-BFGS: STRIDE

下次课

- 平方和理论

参考文献

- J. Wang and V. Magron, *Sparse Polynomial Optimization: Theory and Practice*, World Scientific Publishing, 2023.
- G. Blekherman, P. A. Parrilo, and R. R. Thomas eds., *Semidefinite optimization and convex algebraic geometry*, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2012.
- L. Vandenberghe and M. S. Andersen, *Chordal Graphs and Semidefinite Optimization*, Foundations and Trends® in Optimization, 1(4), pp.241-433, 2015.

更多信息见个人主页

<https://wangjie212.github.io/jiewang>