

华南农业大学期末考试试卷（A 卷）

2009 学年第一学期 考试科目： 概率论与数理统计（解答）

考试类型：（闭卷）

考试时间： 120 分钟

学号 _____ 姓名 _____ 年级专业 _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

一、 填空题（每小题 3 分，共 $3 \times 5 = 15$ 分）

1、 设随机变量 X 服从二项分布 $B(10, p)$ ，若 X 的方差是 $\frac{5}{2}$ ，则 $p = \underline{\frac{1}{2}}$

2、 设随机变量 X 、 Y 均服从正态分布 $N(2, 0.2)$ 且相互独立，则随机变量

$Z = X - 2Y + 1$ 的概率密度函数为 $\underline{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z+1)^2}{2}}} \quad (Y \sim N(-1, 1))$

3、 设二维离散型随机变量 X 、 Y 的联合分布律为：

$X \backslash Y$	0	2	4
0	1/6	1/9	1/18
1	1/3	0	1/3

则联合分布函数值 $F(1, 3) = \underline{\frac{5}{18}}$

4、 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布， x_1, x_2, \dots, x_n 是它的一组样本值，作 λ

的极大似然估计时所用的似然函数 $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \underline{\lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}}$ 。

5、 作单因素方差分析，假定因素有 r 个水平，共作了 n 次试验，当 H_0 为真时，

统计量 $F = \frac{SS_A/df_A}{SS_E/df_E} \sim \underline{F(r-1, n-r)}$

二、单项选择题（每小题 3 分，共 $3 \times 5 = 15$ 分）

1、设 A, B 是两个互斥的随机事件，则必有（ A ）

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (B) $P(A - B) = P(A) - P(B)$

(C) $P(AB) = P(A)P(B)$ (D) $P(A) = 1 - P(B)$

2、设 A, B 是两个随机事件， $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{4}{5}$, $P(B|\bar{A}) = \frac{5}{6}$ ，则（ C ）

(A) $P(\bar{A}|B) = \frac{1}{2}$ (B) $P(\bar{A}|B) = \frac{3}{4}$ (C) $P(\bar{A}|B) = \frac{5}{8}$ (D) $P(\bar{A}|B) = \frac{12}{25}$

3、设 X, Y 为相互独立的两个随机变量，则下列不正确的结论是（ D ）

(A) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$ (B) $E(XY) = E(X)E(Y)$

(C) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ (D) $D(XY) = D(X)D(Y)$

4、作单因素方差分析，假定因素有三个水平，具有共同方差 σ^2 。若第一个水平作了 3 次试验，第二个水平作了 4 次试验，第三个水平作了 5 次试验， SS_T 是总离差平方和，则 $\frac{SS_T}{\sigma^2}$ 服从（ B ）

(A) 自由度为 11 的 t 分布 (B) 自由度为 11 的 χ^2 分布

(C) 自由度为 12 的 t 分布 (D) 自由度为 12 的 χ^2 分布

5、在对一元线性回归方程的统计检验中，设有 n 组数据。回归平方和 SS_R 的自由度是：（ D ）

(A) $n-1$ (B) $n-2$ (C) $(n-1)^2$ (D) L

三、判别题（每小题 2 分，共 $2 \times 5 = 10$ 分）

（请在你认为对的小题对应的括号内打“√”，否则打“×”）

1、（ × ）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$ ，随机变量 Y 的概率密度为

$f_Y(y)$ ，则二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f_X(x)f_Y(y)$ ，

2、（ √ ）设 $\Phi(x)$ 是服从标准正态分布 $N(0,1)$ 的随机变量的分布函数，X 是

服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量，则有 $P\{|X - \mu| < a\} = 2\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right) - 1$

3、(×) 设一维随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 X 的分布律为：

$$P\{X=k\} = \frac{2^k}{k!} e^{-2}, \quad (k=0, 1, 2, \dots, n)$$

4、(√) 若 T 服从自由度为 n 的 t 分布，则 T^2 服从 $F(1, n)$ 分布。

5、(√) 求随机变量 Y 与 X 的线性回归方程 $Y = a + \hat{b}X$ ，在计算公式

$$\begin{cases} a = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} \\ \hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} \end{cases} \text{ 中, } L_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, L_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

四、解答题（每小题 10 分，共 $10 \times 2 = 20$ 分）

1、某饭店一楼刚好停了三部电梯，现有五位乘客要乘电梯，假定他们选择哪部电梯乘坐是随机的，求每部电梯都有乘客的概率。

解：令 A_i 表示事件“没有乘客乘坐第 i 部电梯”， $i=1, 2, 3$ ，则：

$$P(A_i) = \frac{2^5}{3^5}, \quad i=1, 2, 3$$

$$P(A_1 A_2) = P(A_1 A_3) = P(A_2 A_3) = \frac{1}{3^5},$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = 0 \quad (5 \text{ 分})$$

“每部电梯都有乘客”的概率为： $p = 1 - P(A_1 \cup A_2 \cup A_3)$

$$= 1 - P(A_1) - P(A_2) - P(A_3) + P(A_1 A_2) + P(A_1 A_3) + P(A_2 A_3) - P(A_1 A_2 A_3)$$

$$= 1 - 3 \times \frac{2^5}{3^5} + 3 \times \frac{1}{3^5} - 0 = \frac{50}{81} \approx 0.6173 \quad (5 \text{ 分})$$

2、甲、乙两人轮流投篮，甲先投。一般来说，甲、乙两人独立投篮的命中率分别为 0.7 和 0.6。但由于心理因素的影响，如果对方在前一次投篮中投中，紧跟在后面投篮的这一方的命中率就会有所下降，甲、乙的命中率分别变为 0.4 和 0.5。求：

- (1) 乙在第一次投篮中投中的概率；
- (2) 甲在第二次投篮中投中的概率。

解：令 A_1 表示事件“乙在第一次投篮中投中”，

令 B_i 表示事件“甲在第 i 次投篮中投中”， $i=1,2$

$$\begin{aligned}(1) \quad P(A_1) &= P(B_1)P(A_1|B_1) + P(\overline{B_1})P(A_1|\overline{B_1}) \\ &= 0.7 \times 0.5 + 0.3 \times 0.6 = 0.53\end{aligned}\quad (5 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}(2) \quad P(A_1) &= 0.53, \Rightarrow P(\overline{A_1}) = 0.47 \\ P(B_2) &= P(A_1)P(B_2|A_1) + P(\overline{A_1})P(B_2|\overline{A_1}) \\ &= 0.53 \times 0.4 + 0.47 \times 0.7 = 0.541\end{aligned}\quad (5 \text{ 分})$$

五、解答题（每小题 10 分，共 $10 \times 2 = 20$ 分）

1、设随机变量 X 的概率密度为：
$$f(x) = \begin{cases} a - \frac{a}{2}x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}, \text{ 求:}$$

(1) 常数 a ;

(2) X 的分布函数 $F(x)$;

(3) 条件概率 $P\left\{X > \frac{1}{2} \mid X \leq 1\right\}$ 。

$$\text{解: (1) } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^2 \left(a - \frac{a}{2}x\right) dx = \left(ax - \frac{a}{4}x^2\right) \Big|_0^2 = a = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{即 } f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{2}x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$$

$$(2) \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x - \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

$$(3) \quad P\left\{X > \frac{1}{2} \mid X \leq 1\right\} = \frac{P\left\{\frac{1}{2} < X \leq 1\right\}}{P\{X \leq 1\}} = \frac{F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right)}{F(1)} = \frac{5}{12} \quad (2 \text{ 分})$$

2、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 2xe^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}, \text{求}$$

(1) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x)$;

(2) 随机变量 $Z = \sqrt{X}$ 概率密度 $f_Z(z)$ 。

解 (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 2xe^{-y} dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其余} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$

(2) $F_Z(z) = P\{\sqrt{X} < z\},$

当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0 \Rightarrow f_Z(z) = 0$

当 $z > 0$ 时, $F_Z(z) = P\{\sqrt{X} < z\} = P\{X < z^2\} = F_X(z^2)$

$$\Rightarrow f_Z(z) = f_X(z^2) \cdot 2z = \begin{cases} 4z^3, & 0 < z < 1 \\ 0, & z \geq 1 \end{cases}$$

综上所述, $f_Z(z) = \begin{cases} 4z^3, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$

六、解答题 (每小题 10 分, 共 $10 \times 2 = 20$ 分)

1、设总体 $X \sim N(\mu, 3^2)$, 现从 X 中抽取一个容量为 n 的样本, 计算出样本均值 $\bar{x} = 48.4$ 。对 $1 - \alpha = 0.95$ 的置信水平,

(1) 估计 μ 的置信区间;

(2) 若要求置信区间的长度不超过 3, 样本容量 n 至少为多少?

(参考数据: $u_{0.05} = 1.64, u_{0.025} = 1.96, u_{0.005} = 2.58$)

解：(1) 在 $\sigma^2 = 3$ 已知的条件下， μ 在置信水平 $1 - \alpha = 0.95$ 下的置信区间为：

$$\begin{aligned} \left(\bar{x} - u_{0.025} \frac{3}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{0.025} \frac{3}{\sqrt{n}} \right) &= \left(48.4 - 1.96 \frac{3}{\sqrt{n}}, 48.4 + 1.96 \frac{3}{\sqrt{n}} \right) \\ &= \left(48.4 - \frac{5.88}{\sqrt{n}}, 48.4 + \frac{5.88}{\sqrt{n}} \right) \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 令 } 2 \times \frac{5.88}{\sqrt{n}} \leq 3 \Rightarrow n \geq 15.3664, \text{ 即样本容量至少为 } 16. \quad (5 \text{ 分})$$

2、已知某种小麦叶片的宽度 $X \sim N(\mu, 0.048^2)$ ，(单位：cm)，在喷洒一种农药后再抽取 5 张叶片，测得它们的宽度为：1.32；1.55；1.36；1.40；1.44。

(1) 求该样本的均值和方差；

(2) 问喷洒农药后小麦叶片的宽度的方差是否正常 ($\alpha = 0.1$)

(参考数据： $\chi_{0.95}^2(4) = 0.71$, $\chi_{0.05}^2(4) = 9.49$, $\chi_{0.95}^2(5) = 1.15$, $\chi_{0.05}^2(5) = 11.07$)

$$\text{解：(1) } \bar{x} = 1.414, \quad s^2 = \frac{0.03112}{4} = 0.00778 \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 检验假设： } H_0: \sigma^2 = 0.048^2, \quad H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2,$$

$$\text{当 } H_0 \text{ 为真时，统计量 } \chi^2 = \frac{4S^2}{0.048^2} \sim \chi^2(4)$$

$$\text{代入样本数据得 } \chi^2 \text{ 的观察值： } \chi^2 \approx 13.5069$$

$$\text{因为 } 13.5069 > \chi_{0.05}^2(4) = 9.49, \quad \chi_{0.95}^2(4) = 0.71,$$

所以拒绝 H_0 ，即在 $\alpha = 0.1$ 的假设水平下，认为叶宽的方差发生了变化。

(5 分)